

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka PE, 40 g)

GLICERYNA 85%

Glycerolum (85%)

Płyn na skórę, 40 g

Skład:

1 g płynu zawiera: 860 mg gliceryna 99.5%
 140 mg woda oczyszczona

Wskazania do stosowania: stosuje się zewnętrznie na skórę jako łagodny środek przeciwzapalny łagodzący podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na glicerol.

Interakcje: Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane: Nie zanotowano po zastosowaniu miejscowym preparatu.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, tel 224921301, fax 224921309, ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Przy stosowaniu miejscowym preparatu nie są znane przeciwwskazania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Stosować tylko zewnętrznie na skórę.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie należy niewielką ilość płynu miejscowo rozsmarować na skórze. Czynność można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr IL-2436/LN

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990623808

Informacja w systemie Brail'a: gliceryna 85%

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka PE, 50 g)

GLICERYNA 85%

Glycerolum (85%)

Płyn na skórę, 50 g

Skład:

1 g płynu zawiera: 860 mg gliceryna 99.5%
 140 mg woda oczyszczona

Wskazania do stosowania: stosuje się zewnętrznie na skórę jako łagodny środek przeciwzapalny łagodzący podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na glicerol.

Interakcje: Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane: Nie zanotowano po zastosowaniu miejscowym preparatu.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, tel 224921301, fax 224921309, ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Przy stosowaniu miejscowym preparatu nie są znane przeciwwskazania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Stosować tylko zewnętrznie na skórę.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie należy niewielką ilość płynu miejscowo rozsmarować na skórze. Czynność można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr IL-2436/LN

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990623815

Informacja w systemie Brailł'a: gliceryna 85%

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka PE, 100 g)

GLICERYNA 85%

Glycerolum (85%)

Płyn na skórę, 100 g

Skład:

1 g płynu zawiera: 860 mg gliceryna 99.5%
 140 mg woda oczyszczona

Wskazania do stosowania: stosuje się zewnętrznie na skórę jako łagodny środek przeciwzapalny łagodzący podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na glicerol.

Interakcje: Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane: Nie zanotowano po zastosowaniu miejscowym preparatu.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, tel 224921301, fax 224921309, ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Przy stosowaniu miejscowym preparatu nie są znane przeciwwskazania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Stosować tylko zewnętrznie na skórę.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie należy niewielką ilość płynu miejscowo rozsmarować na skórze. Czynność można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr IL-2436/LN

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990623822

Informacja w systemie Brail'a: gliceryna 85%

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka PE, 1 kg)

GLICERYNA 85%

Glycerolum (85%)

Płyn na skórę, 1 kg

Skład:

1 g płynu zawiera: 860 mg gliceryna 99.5%
 140 mg woda oczyszczona

Wskazania do stosowania: stosuje się zewnętrznie na skórę jako łagodny środek przeciwzapalny łagodzący podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na glicerol.

Interakcje: Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane: Nie zanotowano po zastosowaniu miejscowym preparatu.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, tel 224921301, fax 224921309, ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Przy stosowaniu miejscowym preparatu nie są znane przeciwwskazania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Stosować tylko zewnętrznie na skórę.

Sposób stosowania i droga podania:

Opakowanie przeznaczone do leczenia zamkniętego. Stosować według wskazań lekarza. Zewnętrznie należy niewielką ilość płynu miejscowo rozsmarować na skórze. Czynność można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr IL-2436/LN

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990623846

Informacja w systemie Brail'a: gliceryna 85%

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka ze szkła, 50 g)

GLICERYNA 85%

Glycerolum (85%)

Płyn na skórę, 50 g

Skład:

1 g płynu zawiera: 860 mg gliceryna 99.5%
 140 mg woda oczyszczona

Wskazania do stosowania: stosuje się zewnętrznie na skórę jako łagodny środek przeciwzapalny łagodzący podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na glicerol.

Interakcje: Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane: Nie zanotowano po zastosowaniu miejscowym preparatu.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, tel 224921301, fax 224921309, ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Przy stosowaniu miejscowym preparatu nie są znane przeciwwskazania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Stosować tylko zewnętrznie na skórę.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie należy niewielką ilość płynu miejscowo rozsmarować na skórze. Czynność można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr IL-2436/LN

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990623815

Informacja w systemie Brailł'a: gliceryna 85%

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka ze szkła, 100 g)

GLICERYNA 85%

Glycerolum (85%)

Płyn na skórę, 100 g

Skład:

1 g płynu zawiera: 860 mg gliceryna 99.5%
 140 mg woda oczyszczona

Wskazania do stosowania: stosuje się zewnętrznie na skórę jako łagodny środek przeciwzapalny łagodzący podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na glicerol.

Interakcje: Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane: Nie zanotowano po zastosowaniu miejscowym preparatu.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, tel 224921301, fax 224921309, ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Przy stosowaniu miejscowym preparatu nie są znane przeciwwskazania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Stosować tylko zewnętrznie na skórę.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie należy niewielką ilość płynu miejscowo rozsmarować na skórze. Czynność można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr IL-2436/LN

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990623822

Informacja w systemie Brailł'a: gliceryna 85%

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka ze szkła, 500 g)

GLICERYNA 85%

Glycerolum (85%)

Płyn na skórę, 500 g

Skład:

1 g płynu zawiera: 860 mg gliceryna 99.5%
 140 mg woda oczyszczona

Wskazania do stosowania: stosuje się zewnętrznie na skórę jako łagodny środek przeciwzapalny łagodzący podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób nadwrażliwych na glicerol.

Interakcje: Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane: Nie zanotowano po zastosowaniu miejscowym preparatu.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, tel 224921301, fax 224921309, ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Przy stosowaniu miejscowym preparatu nie są znane przeciwwskazania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Stosować tylko zewnętrznie na skórę.

Sposób stosowania i droga podania:

Opakowanie przeznaczone do leczenia zamkniętego. Stosować według wskazań lekarza. Zewnętrznie należy niewielką ilość płynu miejscowo rozsmarować na skórze. Czynność można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

E.Z.M. KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

Pozwolenie nr IL-2436/LN

Nr serii:

Kod EAN UCC: 5909990623839

Informacja w systemie Brail'a: gliceryna 85%