

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panacit, 500 mg, tabletki
Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletką zawiera 500 mg paracetamolu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki

10 tabletek	numer GTIN: 5909991336851
12 tabletek	numer GTIN: 5909991336868
16 tabletek	numer GTIN: 5909991336875
20 tabletek	numer GTIN: 8595566453046
24 tabletki	numer GTIN: 5909991336899
30 tabletek	numer GTIN: 5909991336905
50 tabletek	numer GTIN: 8595566453053

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Stosowanie dawek większych niż zalecane może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zawiera paracetamol. Nie stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Nie stosować tego leku bez zalecenia lekarza, jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub jeśli pacjent ma problem z nadużywaniem alkoholu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

EXP = Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praga

Republika Czeska

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 24104

13. NUMER SERII

Lot

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

W przypadku łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, ból zęba, ból pleców, bóli menstruacyjnych (miesiączki), bóli mięśni i stawów związanych z grypą i (lub) gorączką.

Dorośli i młodzież w wieku 15 lat i starsza:

1-2 tabletki na dawkę, cztery razy dziennie, z odstępem 4-godzinnym pomiędzy kolejnymi dawkami.

Maksymalna dawka pojedyncza to 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobową to 4 g (8 tabletek).

Dzieci i młodzież do 15 lat:

12-15 lat: 1 tabletką, od 4 do 6 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową to 3 g (6 tabletek).

6-12 lat: ½ do 1 tabletki, od 4 do 6 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową dla dzieci ważących 21-24 kg to 1,25 g (2 ½ tabletki); 25-32 kg to 1,5 g (3 tabletki); 33-40 kg to 2 g (4 tabletki).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

panacit

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panacit, 500 mg, tabletki
Paracetamolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Max Pharma s.r.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

{logo podmiotu odpowiedzialnego}