

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDELKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panacit Extra, 500 mg + 65 mg, tabletki
Paracetamolum + Coffeinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletką zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka

10 tabletek	numer GTIN: 5909991307288
12 tabletek	numer GTIN: 5909991307295
20 tabletek	numer GTIN: 5909991307301
24 tabletek	numer GTIN: 5909991307318
30 tabletek	numer GTIN: 8595566451936

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Stosowanie dawek większych niż zalecane może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zawiera paracetamol. Nie należy stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Nie należy stosować tego leku bez zalecenia lekarza, jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub jeśli pacjent ma problem z nadużywaniem alkoholu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

EXP = Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praga 1

Republika Czeska

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 23614

13. NUMER SERII

Lot

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Łagodzenie łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, migrena, bólu pleców, bólu zębów oraz bólu miesiączkowego. Łagodzi objawy grypy i przeziębienia, takie jak ból mięśni lub stawów czy ból gardła oraz gorączkę.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież od 15 lat: 1-2 tabletki do 4 razy na dobę w zależności od potrzeb, z co najmniej 4 godzinnym odstępem pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu 24 godzin.

Młodzież w wieku 12-15 lat: 1 tabletki do 3 razy na dobę w zależności od potrzeb, z co najmniej 6 godzinnym odstępem pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki w ciągu 24 godzin.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

panacit extra

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panacit Extra, 500 mg + 65 mg, tabletki
Paracetamolum + Coffeinum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Max Pharma s.r.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

[logo podmiotu odpowiedzialnego]