

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Menthol Active
500 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 saszetka zawiera jako substancję czynną 500 mg paracetamolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze. Lek zawiera sacharozę, aspartam, sól i barwniki azowe: karmioizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151) – szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 saszetek kod EAN 5909990996971

6 saszetek kod EAN 5909990996988

10 saszetek kod EAN 5909990996995

12 saszetek kod EAN 5909990997008

15 saszetek kod EAN 5909990997053

20 saszetek kod EAN 5909990997060

24 saszetki kod EAN 5909990997077

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania doustnego.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

nie dotyczy

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

nie dotyczy

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo}
Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 20381

13. NUMER SERII

Numer serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Lek zawiera paracetamol.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów grypy lub przeziębienia takich jak: gorączka, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg)

Doustnie, 1 lub 2 saszetki. Zawartość saszetki rozpuścić w gorącej wodzie, dobrze wymieszać i wypić.

W razie konieczności dawkę można powtarzać do 4 razy na dobę lecz nie częściej niż co 4-6 godzin.

Nie stosować więcej niż 8 saszetek w ciągu doby.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

PANADOL MENTHOL ACTIVE

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Saszetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

Panadol Menthol Active, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum

Podanie doustne

2. SPOSÓB PODAWANIA

Zawartość saszetki rozpuścić w gorącej wodzie, dobrze wymieszać.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

LOT

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

nie dotyczy

6. INNE

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg):

Doustnie 1 lub 2 saszetki. Zawartość saszetki rozpuścić w gorącej wodzie, dobrze wymieszać i wypić.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

{Logo Podmiotu odpowiedzialnego}