

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Dr.Max, 500 mg, tabletki
Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletką zawiera 500 mg paracetamolu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 tabletek | - kod: | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 20 tabletek | - kod: | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 30 tabletek | - kod: | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 50 tabletek | - kod: | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Stosowanie dawek wyższych niż zalecane może prowadzić do ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zawiera paracetamol. Nie należy przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Nie należy przyjmować tego leku bez zalecenia lekarza, jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub problemy ze spożywaniem alkoholu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP
EXP = Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praga 1

Republika Czeska

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Lot

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do stosowania w łagodnym do umiarkowanego bólu, objawach grypy i przeziębienia oraz obniżenia gorączki.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: 1-2 tabletki co 4 godziny (2 tabletki dla pacjentów o masie ciała powyżej 60 kg), maksymalna dobową dawką to 8 tabletek.

Młodzież w wieku 12-15 lat: 1 tabletkę co 4-6 godzin, maksymalna dobową dawką to 6 tabletek.

Dzieci w wieku 6-12 lat (21 kg i powyżej): ½ - 1 tabletkę co 4-6 godzin (1 tabletkę dla dzieci o masie ciała 33 kg i powyżej), maksymalna dobową dawką to 2 ½ tabletki dla dzieci o masie ciała 21-24 kg, 3 tabletki dla dzieci o masie ciała 25-32 kg i 4 tabletki dla dzieci o masie ciała 33-40 kg.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

paracetamol dr.max

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Dr.Max, 500 mg, tabletki
Paracetamolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Max Pharma s.r.o.
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE