

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe zawierające 2, 4, 6, 15 lub 30 tabletek powlekanych

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PARACETAMOL HASCO
500 mg, tabletki powlekane
Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

1 tabletki powlekana zawiera:

substancję czynną

Paracetamol (*Paracetamolum*) 500 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

i substancje pomocnicze.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 tabletki powlekane Kod EAN: 5904055004028

4 tabletki powlekane Kod EAN: 5904055004035

6 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990909780

15 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990909797

30 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990909803

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

UWAGA! Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (Tw)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18742

13. NUMER SERII

Numer serii (S)

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeznaczony do stosowania w następujących wskazaniach:

- bóle głowy
- bóle gardła
- migreny
- bóle zębów
- bóle kostne, stawowe i mięśniowe
- bolesne miesiączkowanie
- przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku 6 – 12 lat: ½ - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 4 tabletek na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

paracetamol hasco 500 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister PVC/PVDC/Aluminium

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PARACETAMOL HASCO

500 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Tw

4. NUMER SERII

S

5. INNE