

**Tekst oznakowania opakowania bezpośredniego
(pojemnik z polipropylenu z wieczkiem z polipropylenu,)**

Nazwa:

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym

Nazwa powszechnie

stosowana

Zinci salicylatis pasta

Pasta na skórę, (2 g + 25 g)/100 g

Zawartość w opakowaniu: 10 g

20 g

25 g

30 g

Skład:

Produkt zawiera:

<u>Substancje</u>	- Acidum salicylicum (kwas salicylowy)	2,0 g
<u>czynne:</u>	- Zinci oxydum (tlenek cynku)	25,0 g
<u>Substancje</u>	- Skrobia pszeniczna	
<u>pomocnicze:</u>	- Wazelina biała	

Działanie:

Wysuszające, słabe przeciwbakteryjne.

Wskazania do stosowania:

Pomocniczo w niewielkich wykwitach skórnych w przebiegu trądziku młodzieńczego.

Przeciwwskazania:

Ostre stany zapalne skóry. Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub inne składniki leku nie stosować w obrębie skóry owłosionej oraz na uszkodzoną skórę, rany i owrzodzenia. Nie należy stosować u niemowląt i dzieci do lat 6.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nie stosować na rozległe powierzchnie skóry.

Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu z oczami. Osoby z astmą oskrzelową powinny przed zastosowaniem leku zasięgnąć opinii lekarza. Zachować ostrożność u dzieci poniżej 12 lat; przed zastosowaniem u dzieci należy zasięgnąć opinii lekarza.

Interakcje:

Nie stwierdzono przy stosowaniu zewnętrznym.

Działania niepożądane:

Miejscowe podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować lekarza.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Produkt nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Nakładać rękoma uprzednio dokładnie umyтыми 1-2 razy dziennie; stosować punktowo na zmienione powierzchnie skóry. Po zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca :

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne AVENA Sp. z o.o.

ul. Leśna 42

86-031 Osielsko

Numer pozwolenia:

IL-4910/ChF

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990627851


5909990627868

5909990627875

5909990627929

Informacja o zapisie w systemie Braille'a:

pasta cynkowa z kw. salicylowym



Tekst oznakowania opakowania bezpośredniego
(pojemnik z polipropylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym
z polietylenu)

Opakowanie przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym

Nazwa:

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym

Nazwa powszechnie stosowana

Zinci salicylatis pasta

Pasta na skórę, (2 g + 25 g)/100 g

Zawartość w opakowaniu: 250 g

500 g

1 kg

Skład:

Produkt zawiera:

<u>Substancje czynne:</u>	- Acidum salicylicum (kwas salicylowy)	2,0 g
	- Zinci oxydum (tlenek cynku)	25,0 g
<u>Substancje pomocnicze:</u>	- Skrobia pszeniczna	
	- Wazelina biała	

Działanie:

Wysuszające, słabe przeciwbakteryjne.

Wskazania do stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przeciwwskazania:

Ostre stany zapalne skóry. Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub inne składniki

leku nie stosować w obrębie skóry owłosionej oraz na uszkodzoną skórę, rany i owrzodzenia. Nie należy stosować u niemowląt i dzieci do lat 6.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nie stosować na rozległe powierzchnie skóry.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu z oczami. Osoby z astmą oskrzelową powinny przed zastosowaniem leku zasięgnąć opinii lekarza. Zachować ostrożność u dzieci poniżej 12 lat; przed zastosowaniem u dzieci należy zasięgnąć opinii lekarza.

Interakcje:

Nie stwierdzono przy stosowaniu zewnętrznym.

Działania niepożądane:

Miejscowe podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować lekarza.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Produkt nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne AVENA Sp. z o.o.

ul. Leśna 42

86-031 Osielsko

Numer pozwolenia:

IL-4910/ChF

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC:

5909990627899

5909990627905

5909990627912