

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**TEKTUROWE PUDEŁKO Pimafucort, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, maść****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Pimafucort, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, maść
(*Natamycinum + Hydrocortisonum + Neomycinum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g maści zawiera 10 mg natamycyny, 10 mg hydrokortyzonu, 3500 I.U. neomycyny w postaci siarczanu neomycyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to podłoże maściowe (zawierające parafinę ciekłą oraz 5% polietylen).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kod EAN:

5	9	0	9	9	9	0	2	1	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maść
15 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności = EXP

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dania

[logo] LEO

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2100

13. NUMER SERII

Nr serii =Lot

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp – Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

pimafucort maść

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Tekst na opakowaniu kartonowym:

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBA Pimafucort, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, maść

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Pimafucort, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, maść
(*Natamycinum* + *Hydrocortisonum* + *Neomycinum*)
Droga podania: na skórę

2. SPOSÓB PODAWANIA

Podanie na skórę

3. TERMIN WAŻNOŚCI

(EXP):

4. NUMER SERII

(Lot):

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB
LICZBY JEDNOSTEK**

15 g

6. INNE

[logo] LEO