

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Polopiryna C Plus, (500 mg + 300 mg + 200 mg), proszek musujący
Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego, 200 mg wapnia (w postaci laktoglukonianu wapnia - 1,55 g)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym: aspartam i sól. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek musujący

6 saszetek Kod: 5909990854011

10 saszetek Kod: 5909990854028

14 saszetek Kod: 5909990854035

20 saszetek Kod: 5909990851955

28 saszetek Kod: 5909990854042

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
(logo) POLPHARMA

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8540

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

o smaku cytrynowym

Lek wieloskładnikowy

- przeciwgorączkowo
- przeciwbólowo
- przeciwzapalnie

Gorączka i dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem i grypą

Wskazania i opis działania:

- Gorączka i dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem i grypą
- Bóle o lekkim i średnim nasileniu (bóle zębów, nerwobóle, bóle stawów i mięśni, bóle głowy, migrena)

Polopiryna C Plus jest lekiem wieloskładnikowym, który łączy działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne kwasu acetylosalicylowego z przeciwwysiękowym, przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym wapnia. Kwas askorbowy uzupełnia w organizmie niedobory witaminy C, powstające np. w przebiegu przeziębienia i grypy.

Sposób stosowania:

Dorośli: 1-2 saszetki 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową - 6 saszetek). Pacjenci w wieku powyżej 65 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową - 3 saszetki). Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową - 3 saszetki). Leku

nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Zawartość saszetki rozpuścić w ½ szklanki przegotowanej letniej wody, wymieszać i wypić. Lek zaleca się przyjmować po posiłku. Nie stosować leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

polopiryna c plus

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polopiryna C Plus, (500 mg + 300 mg + 200 mg), proszek musujący
Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
(logo) Polpharma

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

o smaku cytrynowym

- przeciwgorączkowo
- przeciwbólowo
- przeciwzapalnie

Wskazania:

- Gorączka i dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem i grypą
- Bóle o lekkim i średnim nasileniu (bóle zębów, nerwobóle, bóle stawów i mięśni, bóle głowy, migrena)

Sposób stosowania:

Dorośli: 1-2 saszetki 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową - 6 saszetek). Pacjenci w wieku powyżej 65 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową - 3 saszetki). Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową - 3 saszetki). Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Zawartość saszetki rozpuścić w ½ szklanki przegotowanej, letniej wody, wymieszać i wypić. Lek zaleca się przyjmować po posiłku. Nie stosować leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.