

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**Etykieta**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA**

Posorutin  
50 mg/ml  
krople do oczu, roztwór

*Troxerutinum*

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności

**4. NUMER SERII**

Nr serii

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

10 ml

**6. INNE**

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez okres 6 tygodni.

URSAPHARM Poland Sp. z o.o.

01-531

Warszawa

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Posorutin 50 mg/ml  
Krople do oczu, roztwór

*Troxerutinum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 ml roztworu zawiera 50 mg trokserutyny.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych:

1 ml roztworu zawiera 0,25 mg chlorheksydyny diglukonianu w postaci roztworu 20%, co odpowiada 0,05 mg chlorheksydyny glukonianu, sodu chlorek, disodu edytynian, wodę do wstrzykiwań lub wodę wysokooczyszczoną.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Krople do oczu, roztwór  
10 ml

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990728312

### 5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

URSAPHARM Poland Sp. z o.o.  
Wybrzeże Gdyńskie 27  
01-531 Warszawa

**12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 7283

**13. NUMER SERII**

Nr serii

**14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Zakraplać 3 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego.  
Po pierwszym otwarciu butelki, lek można stosować przez okres 6 tygodni.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

posorutin

## **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D**

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

## **18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC: [kod produktu]

SN: [numer seryjny]

NN: [krajowy numer refundacyjny lub inny krajowy numer identyfikujący produkt leczniczy]