

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (butelki)

primasept med

(10 g + 8 g + 2 g)/100 g roztwór na skórę
(*Propanolum + Alcohol isopropylicus + 2-Biphenylol*)

450 ml Kod EAN UCC: 5909990425358

500 ml Kod EAN UCC: 5909990667659

1 l Kod EAN UCC: 5909990425365

Skład:

100 g roztworu zawiera:

- substancje czynne: propanol, alkohol izopropylowy, 2-difenyloł
- substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina- roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), wodorotlenek potasu, mieszanina nasyconych kwasów tłuszczowych z ziarna palmy (C10-C18), substancje zapachowe, hydroksyetyloceluloza, żółcień chinolinowa (E 104), disodu edetynian, woda oczyszczona.

Wyłącznie do stosowania na skórę

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt
Niemcy

Pozwolenie 13043

Termin ważności:

Numer serii:

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

primasept med

Opis działania:

Lek primasept med działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Lek primasept med działa na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* oraz *Listeria monocytogenes*) oraz mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*).

Lek primasept med działa grzybobójczo, m.in. na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) i dermatofity (w tym *Trichophyton mentagrophytes* oraz *Microsporum gypseum*). Lek działa wirusobójczo, m.in. na HIV-1, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, *herpes simplex*, wirusa grypy azjatyckiej.

Wskazania:

Dezynfekcja i mycie rąk. Dezynfekcja i mycie ciała.

Kiedy nie stosować leku primasept med

Nie stosować w przypadku uczulenia na propanol, alkohol izopropylowy, 2-difenylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Sposób użycia:

Lek primasept med stosowany jest bez rozcieńczenia.

Higieniczna dezynfekcja i mycie rąk:

3 ml roztworu na skórę wcierać porcjami w suche dłonie przez 1 minutę, następnie zwilżyć dłonie niewielką ilością wody, wytworzyć pianę i przez kolejną 1 minutę wcierać wytworzoną pianę w dłonie.

Ostatecznie spłukać dokładnie pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ręce.

Higieniczna dezynfekcja i mycie ciała:

3 ml roztworu na skórę rozprowadzić porcjami na skórze o powierzchni 900 cm² (powierzchnia ta odpowiada np. powierzchni przedramienia) i pozostawić na 1 minutę, następnie przy pomocy niewielkiej ilości wody wytworzyć pianę i myć skórę przez kolejną 1 minutę. Po upływie tego czasu spłukać pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ciało.

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem stosowania leku primasept med należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w leku mogą działać podrażniająco. Lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek łatwopalny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Lek primasept med a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku primasept med

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
tel. 022-11-60-700, fax: 022-11-60-701

Data ostatniej aktualizacji tekstu:

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (kanister)

primasept med

(10 g + 8 g + 2 g)/100 g roztwór na skórę
(*Propanolum + Alcohol isopropylicus + 2-Biphenylol*)

51 **Kod EAN UCC: 5909990425372**

Skład:

100 g roztworu zawiera:

- substancje czynne: propanol, alkohol izopropylowy, 2-difenyłol
- substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina- roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), wodorotlenek potasu, mieszanina nasyconych kwasów tłuszczowych z ziarna palmy (C10-C18), substancje zapachowe, hydroksyetyloceluloza, żółcień chinolinowa (E 104), disodu edetynian, woda oczyszczona.

Wyłącznie do stosowania na skórę

Opis działania:

Lek primasept med działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Lek primasept med działa na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* oraz *Listeria monocytogenes*) oraz mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*).

Lek primasept med działa grzybobójczo, m.in. na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) i dermatofity (w tym *Trichophyton mentagrophytes* oraz *Microsporum gypseum*). Lek działa wirusobójczo, m.in. na HIV-1, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, *herpes simplex* , wirusa grypy azjatyckiej.

Wskazania:

Dezynfekcja i mycie rąk. Dezynfekcja i mycie ciała.

Kiedy nie stosować leku primasept med

Nie stosować w przypadku uczulenia na propanol, alkohol izopropylowy, 2-difenyłol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Sposób użycia:

Lek primasept med stosowany jest bez rozcieńczenia.

Higieniczna dezynfekcja i mycie rąk:

3 ml roztworu na skórę wcierać porcjami w suche dłonie przez 1 minutę, następnie zwilżyć dłonie niewielką ilością wody, wytworzyć pianę i przez kolejną 1 minutę wcierać wytworzoną pianę w dłonie.

Ostatecznie spłukać dokładnie pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ręce.

Higieniczna dezynfekcja i mycie ciała:

3 ml roztworu na skórę rozprowadzić porcjami na skórze o powierzchni 900 cm² (powierzchnia ta odpowiada np. powierzchni przedramienia) i pozostawić na 1 minutę, następnie przy pomocy niewielkiej ilości wody wytworzyć pianę i myć skórę przez kolejną 1 minutę. Po upływie tego czasu spłukać pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ciało.

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem stosowania leku primasept med należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w leku mogą działać podrażniająco. Lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek łatwopalny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Lek primasept med a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Lekczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku primasept med

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Schülke & Mayr GmbH

Robert Koch Str. 2

22851 Norderstedt

Niemcy

Pozwolenie 13043

Termin ważności:

Numer serii:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

tel. 022-11-60-700, fax: 022-11-60-701

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

primasept med

Data ostatniej aktualizacji tekstu: