

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**TEKTUROWE PUDEŁKO****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Proficar, 75 mg, tabletki dojelitowe

Acidum acetylsalicylicum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 tabletek dojelitowych

30 tabletek dojelitowych

60 tabletek dojelitowych

60 tabletek dojelitowych

60 tabletek dojelitowych

30 tabletek dojelitowych

60 tabletek dojelitowych

Kod EAN	5	9	0	9	9	9	0	8	2	8	8	1	4
Kod EAN	5	9	0	9	9	9	0	8	2	8	8	2	1
Kod EAN	5	9	0	9	9	9	0	8	2	8	8	4	5
Kod EAN	5	9	0	9	9	9	0	8	2	8	8	5	2
Kod EAN	5	9	0	9	9	9	0	8	2	8	8	3	8
Kod EAN	5	9	0	9	9	9	0	8	2	8	8	6	9
Kod EAN	5	9	0	9	9	9	0	8	2	8	8	7	6

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

(Logo)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POZWOLENIE NR: 8288

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

LEK W ZAPOBIEGANIU PIERWSZEMU ZAWAŁOWI SERCA

WSKAZANIE:

Hamowanie agregacji płytek krwi m.in. w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka.

DAWKOWANIE:

Zalecana początkowa, jednorazowa dawka – 150 mg na dobę.
Dawka podtrzymująca – 75 mg na dobę.

Uwaga: Tabletki połykać w całości, nie rozgryzać.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

proficar 75mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Proficar, 75 mg, tabletki dojelitowe

Acidum acetylsalicylicum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Adamed

(Logo)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

4. NUMER SERII

Nr serii i termin ważności na zgrzewie folii

5. INNE

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Etykieta na pojemnik

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Proficar, 75 mg, tabletki dojelitowe

Acidum acetylsalicylicum

2. SPOSÓB PODAWANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

30 tabletek

60 tabletek

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów

(Logo)

7. INNE