

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PULNOZIN MUCO o smaku czarnej porzeczki
750 mg, tabletki do ssania
Carbocisteinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletki do ssania zawiera 750 mg karbocysteiny

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: izomalt, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, niskopodstawiona, sodu alginian, magnezu stearynian, wapnia fosforan, aromat czarnej porzeczki 502009 AP0560 [maltodekstryna kukurydziana, trioctan glicerolu (E1518), trietylu cytrynian (E1505), substancje aromatyzujące], sukraloza (E955), aromat miętowy SD0627 [olejek naturalny z mięty pieprzowej, olejek naturalny z mięty zielonej, mentol, maltodekstryna, guma arabska (E414), glikol propylenowy (E1520)].

Szczegółowe informacje, patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 tabletek do ssania	kod
20 tabletek do ssania	kod
30 tabletek do ssania	kod
40 tabletek do ssania	kod

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania leku.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

Podmiot odpowiedzialny:

Solinea Sp. z o.o.
Elizówka, ul. Szafranowa 6
21-003 Ciecierzyn

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- Ułatwia odkrztuszanie
- Uplynnia wydzielinę z dróg oddechowych

WSKAZANIA:

Objawowe leczenie chorób dróg oddechowych przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza)

- Początkowa dawka wynosi 1 tabletkę do ssania 3 razy na dobę.
- Jeśli nasilenie objawów zmniejszy się, dawkę należy zmniejszyć do 1 tabletki do ssania 2 razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem.

Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

pulnozin muco o smaku czarnej porzeczki

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PULNOZIN MUCO o smaku czarnej porzeczki
750 mg, tabletki do ssania
Carbocisteinum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Solinea Sp. z o.o. {logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE