

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### TEKTUROWE PUDEŁKO

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PULNOZIN MUCO o smaku limonki  
750 mg, tabletki do ssania  
*Carbocisteinum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletki do ssania zawiera 750 mg karbocysteiny

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: izomalt, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, niskopodstawiona, sodu alginian, magnezu stearynian, wapnia fosforan, aromat limonkowy SD1820 [guma arabska, maltodekstryna, triacetyna], sukraloza (E 955), aromat miętowy SD0627 [guma arabska, maltodekstryna, glikol 1,2-propylenowy].  
Szczegółowe informacje, patrz ulotka.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 tabletek do ssania	kod
20 tabletek do ssania	kod
30 tabletek do ssania	kod
40 tabletek do ssania	kod

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

#### 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania leku.

#### 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

**Podmiot odpowiedzialny:**

Solinea Sp. z o.o.  
Elizówka, ul. Szafranowa 6  
21-003 Ciecierzyn

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

- Ułatwia odkrztuszanie
- Uplynnia wydzielinę z dróg oddechowych

**WSKAZANIA:**

Objawowe leczenie chorób dróg oddechowych przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

**DAWKOWANIE:**

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza):

- Początkowa dawka wynosi: 1 tabletkę do ssania 3 razy na dobę.
- Jeśli nasilenie objawów zmniejszy się, dawkę należy zmniejszyć do 1 tabletki do ssania 2 razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem.

Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

pulnozin muco o smaku limonki

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

PULNOZIN MUCO o smaku limonki  
750 mg, tabletki do ssania  
*Carbocisteinum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Solinea Sp. z o.o.  
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. INNE**