

TEKST OZNAKOWANIA OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Liść brzozy

Betulae folium

Zioła do zaparzania w saszetkach

15 saszetek po 3,0 g

Skład:

Betulae folium (liść brzozy) - 3,0 g

Jedna saszetka zawiera 3,0 g liścia brzozy o zawartości nie mniej niż 1,5% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Działanie:

Moczopędne.

Wskazania do stosowania:

W łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych, w celu zwiększania ilości wydalanego moczu.

Dawkowanie i sposób podawania:

Jedną saszetkę zalać szklanką wody, ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie pozostawić na 10-15 minut pod przykryciem. Pić 2-3 razy dziennie świeżo przygotowany odwar.

Przeciwwskazania:

Obrzęki spowodowane ograniczoną czynnością serca i nerek. Nadwrażliwość na brzozę lub pyłek brzozy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania liścia brzozy u dzieci nie zaleca się stosowania produktu. W przypadku nasilenia się lub nieustąpienia objawów w ciągu 2-3 tygodni należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:

Dotychczas nie stwierdzono.

Stosowanie podczas ciąży lub laktacji:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Nieznany.

Działania niepożądane:

Możliwość wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka) oraz reakcji alergicznych (świąd, pokrzywka, wysypka skórna).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Brak danych na temat przedawkowania.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Labofarm sp. z o.o.
ul. Lubichowska 176B
83-200 Starogard Gdański
tel. 058 561-20-08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data opracowania informacji:

Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 12357

Kod: 5909990618651

TEKST OZNAKOWANIA OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Liść brzozy

Betulae folium

Zioła do zaparzania w saszetkach

20 saszetek po 3,0 g

Skład:

Betulae folium (liść brzozy) - 3,0 g

Jedna saszetka zawiera 3,0 g liścia brzozy o zawartości nie mniej niż 1,5% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Działanie:

Moczopędne.

Wskazania do stosowania:

W łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych, w celu zwiększania ilości wydalanego moczu.

Dawkowanie i sposób podawania:

Jedną saszetkę zalać szklanką wody, ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie pozostawić na 10-15 minut pod przykryciem. Pić 2-3 razy dziennie świeżo przygotowany odwar.

Przeciwwskazania:

Obrzęki spowodowane ograniczoną czynnością serca i nerek. Nadwrażliwość na brzozę lub pyłek brzozy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania liścia brzozy u dzieci nie zaleca się stosowania produktu. W przypadku nasilenia się lub nieustąpienia objawów w ciągu 2-3 tygodni należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:

Dotychczas nie stwierdzono.

Stosowanie podczas ciąży lub laktacji:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Nieznany.

Działania niepożądane:

Możliwość wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka) oraz reakcji alergicznych (świąd, pokrzywka, wysypka skórna).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Brak danych na temat przedawkowania.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Labofarm sp. z o.o.
ul. Lubichowska 176B
83-200 Starogard Gdański
tel. 058 561-20-08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data opracowania informacji:

Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 12357

Kod: 5909990618668

TEKST OZNAKOWANIA OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Liść brzozy

Betulae folium

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 3,0 g

Skład:

Betulae folium (liść brzozy) - 3,0 g

Jedna saszetka zawiera 3,0 g liścia brzozy o zawartości nie mniej niż 1,5% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Działanie:

Moczopędne.

Wskazania do stosowania:

W łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych, w celu zwiększania ilości wydalanego moczu.

Dawkowanie i sposób podawania:

Jedną saszetkę zalać szklanką wody, ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie pozostawić na 10-15 minut pod przykryciem. Pić 2-3 razy dziennie świeżo przygotowany odwar.

Przeciwwskazania:

Obrzęki spowodowane ograniczoną czynnością serca i nerek. Nadwrażliwość na brzozę lub pyłek brzozy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania liścia brzozy u dzieci nie zaleca się stosowania produktu. W przypadku nasilenia się lub nieustąpienia objawów w ciągu 2-3 tygodni należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:

Dotychczas nie stwierdzono.

Stosowanie podczas ciąży lub laktacji:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Nieznany.

Działania niepożądane:

Możliwość wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka) oraz reakcji alergicznych (świąd, pokrzywka, wysypka skórna).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Brak danych na temat przedawkowania.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Labofarm sp. z o.o.
ul. Lubichowska 176B
83-200 Starogard Gdański
tel. 058 561-20-08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data opracowania informacji:

Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 12357

Kod: 5909990618675