

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Remifemin

0,018 – 0,026 ml, tabletki

Cimicifugae racemosae rhizomae extractum fluidum (0,78-1,14:1) isopropanolicum 40% (v/v)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

1 tabletki zawiera 0,018-0,026 ml wyciągu z kłącza pluskwicy groniastej - Cimicifugae racemosae rhizomae extracum fluidum (0,78 – 1,14:1) isopropanolicum 40% (V/V)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: cellaktoza (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, olejek miętowy

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 tabletek	KOD EAN: 5909990908516
60 tabletek	KOD EAN: 5909990908523
100 tabletek	KOD EAN: 5909990908530
200 tabletek	KOD EAN: 5909990908547

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania:

Dorośle kobiety: 2 razy dziennie po jednej tabletki.

Pierwsze terapeutyczne efekty działania leku pojawiają się po 2 tygodniach stosowania.

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Tabletki zawierają laktozę.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 35
38259 Salzgitter, Niemcy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Orkla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 9085

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Remifemin stosuje się jako środek łagodzący dolegliwości okresu menopauzy takie jak przyływy uczucia gorąca i nadmierne pocenie się.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

remifemin