

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Rennie Extra

Calcii carbonas + Magnesii subcarbonas ponderosus + Acidum alginicum

625 mg + 73,50 mg + 150 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletką do rozgryzania i żucia zawiera: 625 mg wapnia węglanu, 73,50 mg magnezu węglanu ciężkiego i 150 mg kwasu alginowego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również dekstrany, glukozę, sól i sacharozę.

Więcej informacji podano w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

12 tabletek	kod 5908229303368
18 tabletek	kod 5908229303375
24 tabletki	kod 5908229303382
30 tabletek	kod 5908229303399
36 tabletek	kod 5908229303405
48 tabletek	kod 5908229303412

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek **Rennie Extra** łagodzi zgagę i niestrawność związane z nadkwaśnością soku żołądkowego.

Lek Rennie Extra działa na dwa sposoby:

1. Kwas alginowy tworzy w żołądku barierę ochronną, która zapobiega przedostawaniu się kwasu w górę przełyku, łagodząc w ten sposób piekący ból w nadbrzuszu.
2. Węglan wapnia i węglan magnezu zapewniają szybkie i długotrwałe zobojętnienie nadmiaru kwasu w żołądku.

Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki do rozgryzania i żucia, najlepiej 1 godzinę po posiłku i przed snem. W przypadku wystąpienia zgagi można przyjąć 2 tabletki pomiędzy zwykłymi porami dawkowania. Takie dawkowanie może być również stosowane w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie należy przyjmować więcej niż 12 tabletek w ciągu 24 godzin. Należy unikać długotrwałego stosowania. Jeżeli objawy nie ustąpią w ciągu 14 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nazwa Rennie® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Bayer (logo podmiotu odpowiedzialnego)

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Rennie Extra

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rennie Extra

Calcii carbonas + Magnesii subcarbonas ponderosus + Acidum alginicum

625 mg + 73,50 mg + 150 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

(logo) Bayer

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE