

EXP:
Lot:
PC:
SN:

kod
2D

Tu
otworzyć



0,5 mg/mL
resbud
Budesonidum

0,5 mg/mL zawiesina do nebulizacji

1 ampułka zawiera 1 mg budesonidu
w 2 mL zawiesiny.

20 ampułek po 2 mL

0,5 mg/mL
resbud
Budesonidum

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowińska 14A
05-170 Zakroczym

Pozwolenie nr 28368

EXP oznacza termin ważności.
Ul. oznacza numer serii.

20 ampułek po 2 mL

0,5 mg/mL
resbud
Budesonidum

1 mL zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,5 mg budesonidu.
Substancje pomocnicze: polisorbat 80, sodu chlorek, disodu edetynian, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, woda do wstrzykiwań.

Podanie wziewne. Stosować przy użyciu nebulizatora.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Okres ważności leku po otwarciu torebki leczniczej: 3 miesiące.

Po otwarciu ampułki: jeżeli zawartość ampułki nie zostanie zużyta natychmiast, pozostałość leku należy wyrzucić.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Ampułki przechowywać w torebce leczniczej w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

UWAGA: Lek nie jest przeznaczony do wstrzykiwań.
Stosować wyłącznie przy użyciu nebulizatora.

Rp - Lek wydawany na receptę.

20 ampułek po 2 mL



lekam

lekam

lekam

lekam

lekam

lekam

lekam

lekam

lekam

lekam

Resbud

0,5 mg/mL



Pantone 185 C

Braille

resbud

0,5 mg/mL

Zawiesina do nebulizacji

Podanie wziewne

Budesonidum 5 ampułek po 2 mL

1 ampułka zawiera
1 mg budezonidu
w 2 mL zawiesiny.

lekam 

UWAGA: Lek nie jest przeznaczony do wstrzykiwań.

Stosować wyłącznie przy użyciu nebulizatora. Przed zastosowaniem przeczytać ulotkę.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Ampułki przechowywać w torebce leczniczej w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności leku po otwarciu torebki leczniczej: 3 miesiące. Po otwarciu ampułki: jeżeli zawartość ampułki nie zostanie zużyta natychmiast, pozostałość leku należy wyrzucić.

EXP:

Lot:

Code No.: XX/DRUGS/XXXX

Batch
Over Printing
Area

XXXXXX

resbud **0,5 mg/mL**
do nebulizacji 2 mL

Poniższe zapisy znajdują się na zgrzewie ampułki:

EXP:

Lot: