

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

OPAKOWANIE BEZPOŚREDNIE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rexorubia
granulat
Homeopatyczny produkt leczniczy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 g granulatu zawiera:
Substancje czynne: Natrium sulfuricum D6 1,2 g, Silicea D6 4,0 g, Calcarea carbonica D8 4,0 g, Calcarea iodata D8 2,0 g, Calcarea phosphorica D4 4,0 g, Natrium phosphoricum D4 2,0 g, Magnesia phosphorica D4 1,2 g, Ferrum phosphoricum D4 1,2 g, Rubia tinctoria D6 4,0 g, Juglans pulvis D6 4,0 g.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza
W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać ulotkę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

granulat
350 g
kod EAN: 5909996388510

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zażywać leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Bez specjalnych wymagań

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny
Laboratoires LEHNING
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte Barbe
Francja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-3885/LN-H

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Wspomagająco w leczeniu niedoborów soli mineralnych.

Sposób stosowania i droga podania

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5g).

U dzieci do 12 lat stosować wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:

Dzieci 6-12 lat: 3 razy dziennie od 1 do ½ łyżeczki (2,5-5 g).

Dzieci poniżej 6 lat: ½ łyżeczki (2,5 g) 2 razy dziennie.

Nie zaleca się stosowania u dzieci, które nie ukończyły 30 miesiąca życia (2,5 roku).

Przed podaniem leku dzieciom rozpuścić granulat w niewielkiej ilości wody.

Lek należy stosować pół godziny przed posiłkiem.

Przed połknięciem, lek należy przetrzymać chwilę pod językiem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A



Logo firmy „Lehning Laboratoires”, adres

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.