

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka ze szkła

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Flunimeg, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Fluniksyna	50 mg
(w postaci fluniksyny z meglumina)	83 mg)

Substancje pomocnicze:

Sodu formaldehydosulfoksydan	2,5 mg
Fenol	5 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koń, bydło, świnia.

4. DROGI PODANIA

Konie: 1 ml na 45 kg m.c., i.v.
Bydło: 2 ml na 45 kg m.c., i.v.
Świnie: 2 ml na 45 kg m.c, i.m.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne koni i bydła - 10 dni.

Tkanki jadalne świń - 18 dni.

Mleko krów - 36 godzin.

Produkt niedopuszczony do stosowania u klaczy, produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot

Inne informacje:

50 ml

100 ml

Wyłącznie dla zwierząt

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie nr 641/99