

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH I OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH:

Opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sallevia, 110 mg/ml, syrop
Thymi extractum fluidum

2. ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI CZYNNNEJ / SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml (1,1 g) syropu zawiera 110 mg (0,11 ml) płynnego wyciągu z ziela tymianku (1:2-2,5).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera etanol i sorbitol (E 420). W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop
200 ml

5. SPOSÓB I DROGA/DROGI PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

TERMIN WAŻNOŚCI:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Conforma NV
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
Belgia

12. NUMER POZWOLENIA / NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

23861

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Produktywny (mokry) kaszel towarzyszący przeziębieniu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazanie opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania. Nie zawiera cukru.

Instrukcja użycia: przyjąć lek przy użyciu dołączonej miarki. Nie stosować:

- U dzieci w wieku poniżej 4 lat.
- W przypadku alergii na którykolwiek składnik produktu.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 5 dni lub wystąpią niepożądane objawy nieopisane w ulotce dołączonej do opakowania, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wiek	Dawka	Maksymalna dawka/dobę
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat	5 ml, 5 razy dziennie	25 ml
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat	10-20 ml, 3 razy dziennie	60 ml

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Sallevia

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
I OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH:**

Butelka 200 ml (etykieta)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sallevia, 110 mg/ml, syrop
Thymi extractum fluidum

2. ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI CZYNNNEJ / SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml (1,1 g) syropu zawiera 110 mg (0,11 ml) płynnego wyciągu z ziela tymianku (1:2-2,5).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera etanol i sorbitol (E 420). W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop
200 ml

5. SPOSÓB I DROGA/DROGI PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

TERMIN WAŻNOŚCI:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Conforma NV
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
Belgia

12. NUMER POZWOLENIA / NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

23861

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Produktywny (mokry) kaszel. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazanie opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania. Nie zawiera cukru.

Instrukcja użycia: przyjąć lek przy użyciu dołączonej miarki. Nie stosować:

- U dzieci w wieku poniżej 4 lat.
- W przypadku alergii na którykolwiek składnik produktu.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 5 dni lub wystąpią niepożądane objawy nieopisane w ulotce dołączonej do opakowania, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wiek	Dawka	Maksymalna dawka/dobę
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat	5 ml, 5 razy dziennie	25 ml
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat	10-20 ml, 3 razy dziennie	60 ml

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A