

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudelko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Santaherba
krople doustne, roztwór
Homeopatyczny produkt leczniczy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml kropli zawiera
Substancje czynne: Yerba santa D3 3,33 ml, Ipeca D4 3,33 ml, Lobelia inflata D3 3,33 ml, Adrenalinum D6 3,33 ml, Belladonna D4 3,33 ml Stramonium D4 3,33 ml, Solidago virga aurea D3 3,33 ml, Ephedra vulgaris D4 3,33 ml, Galeopsis ochroleuca TM 3,33 ml, Sambucus nigra TM 3,33 ml, Crataegus oxyacantha TM 3,33 ml.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera 39,5% v/v etanolu.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

krople doustne, roztwór
Butelka 30 ml kod EAN: 5 909996 4 184 15

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zażywać leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny
Laboratoires LEHNING
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe - Francja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-4184/LN-H

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

WSKAZANIA

Wspomagająco w katarze siennym.

SPOSÓB STOSOWANIA I DROGA PODANIA

Doustnie.

Dorośli: 3 razy dziennie po 30 kropli.

Młodzież od 12 do 18 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli.

Dzieci od 6 do 11 lat: po konsultacji z lekarzem, jeśli lekarz nie zaleci inaczej: 10 kropli 3 razy dziennie.

Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.

U dzieci podawać lek nie częściej, niż co 4 godziny i nie stosować dłużej niż zalecił lekarz.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEME BRAILLE’A



Logo firmy „Lehning Laboratoires”, adres