

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Sebidin Intensive, 5 mg + 5 mg, tabletki do ssania
(*Chlorhexidini dihydrochloridum* + *Benzocainum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletki do ssania zawiera: 5 mg chlorheksydydy dichlorowodoru (*Chlorhexidini dihydrochloridum*) i 5 mg benzokainy (*Benzocainum*).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Ponadto lek zawiera: manitol, celulozę mikrokrystaliczną (PH 101), powidon K29/32, magnezu stearynian, sodu cyklamian (E 952), sodu sacharynian (E 954), aromat mentolowy 611072E, aromat pomarańczowy 90103-71.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

20 tabletek
tabletki do ssania
<EAN> 5907734711729

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.
Tabletki do ssania nie należy rozgryzać ani połykać.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Perrigo Poland Sp. z o.o. <+logo>
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 25235

13. NUMER SERII

Nr serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ból i zakażenia jamy ustnej i gardła.
Działanie przeciwbólowe, przeciwbakteryjne i miejscowo znieczulające.

Sebidin Intensive zaleca się stosować do leczenia miejscowych objawów zakażenia jamy ustnej i gardła, takich jak:

- ból i podrażnienie gardła
- stany zapalne błony śluzowej w postaci aft
- bezgłos

Bez cukru

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Powoli ssąć tabletkę w jamie ustnej. Stosować 1 tabletkę co 2 godziny, do 8 tabletek na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Sebidin Intensive

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Nie dotyczy.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>