

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (butelka)

sensiva

(45 g + 28 g + 0,3 g)/100 g, roztwór na skórę
(*Propanolum* + *Alcohol isopropylicus* + *Acidum lacticum*)

150 ml	Kod EAN UCC: 5909990425389
450 ml	Kod EAN UCC: 5909990425396
500 ml	Kod EAN UCC: 5909990666584
1 l	Kod EAN UCC: 5909990425426

Skład:

100 g roztworu na skórę zawiera:

- substancje czynne: propanolu 45 g, alkoholu izopropylowego 28 g, kwasu mlekowego 0,3 g;
- substancje pomocnicze:
 - alkohol mirystynowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol 85%, sodu mleczan, woda oczyszczona.

Wyłącznie do stosowania na skórę:

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2
22851 Norderstedt
Niemcy

Pozwolenie nr **13044**

Termin ważności:

Numer serii:

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

sensiva

Opis działania:

Lek działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.

Lek sensiva działa na drobnoustroje, takie jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym *Staphylococcus aureus*, paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis* oraz *Klebsiella pneumoniae*) i mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*). Lek sensiva działa grzybobójczo, m.in. na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) i dermatofity (w tym *Trichophyton mentagrophytes*

oraz *Microsporium gypseum*). Lek działa wirusobójczo na wirusy, m.in. na HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy oraz wirus krowianki.

Wskazania:

Lek sensiva jest alkoholowym produktem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

Kiedy nie stosować leku sensiva

Nie stosować w przypadku uczulenia na propanol, alkohol izopropylowy, kwas mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:

3 ml leku sensiva należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi:

W umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml leku sensiva przez 90 sekund, dbając o stałe zwilżenie skóry lekiem.

Począć do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem stosowania leku sensiva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek sensiva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku sensiva

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek łatwopalny.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
tel. 022-11-60-700, fax: 022-11-60-701

Data ostatniej aktualizacji tekstu:

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (butelka)

sensiva

(45 g + 28 g + 0,3 g)/100 g, roztwór na skórę
(*Propanolum* + *Alcohol isopropylicus* + *Acidum lacticum*)

5 1 Kod EAN UCC: 5909990808175

Skład:

100 g roztworu na skórę zawiera:

- substancje czynne: propanolu 45 g, alkoholu izopropylowego 28 g, kwasu mlekowego 0,3 g;
- substancje pomocnicze:
alkohol mirystynowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol 85%, sodu mleczan, woda oczyszczona.

Wyłączenie do stosowania na skórę

Opis działania:

Lek *sensiva* działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.

Lek *sensiva* działa na drobnoustroje, takie jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym *Staphylococcus aureus*, paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis* oraz *Klebsiella pneumoniae*) i mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*). Lek *sensiva* działa grzybobójczo, m.in. na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) i dermatofity (w tym *Trichophyton mentagrophytes* oraz *Microsporum gypseum*). Lek działa wirusobójczo na wirusy, m.in. na HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy oraz wirus krowianki.

Wskazania:

Lek *sensiva* jest alkoholowym produktem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

Kiedy nie stosować leku *sensiva*

Nie stosować w przypadku uczulenia na propanol, alkohol izopropylowy, kwas mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:

3 ml leku *sensiva* należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi:

W umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml leku *sensiva* przez 90 sekund, dbając o stałe zwilżenie skóry lekiem.

Począć do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem stosowania leku *sensiva* należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek sensiva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku sensiva

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

Lek łatwopalny.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Pozwolenie nr **13044**

Termin ważności:

Numer serii:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Schülke & Mayr GmbH

Robert Koch Strasse 2

22851 Norderstedt

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

tel. 022-11-60-700, fax: 022-11-60-701

Data ostatniej aktualizacji tekstu:

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

sensiva

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO (pojemnik)

sensiva

(45 g + 28 g + 0,3 g)/100 g, roztwór na skórę
(*Propanolum* + *Alcohol isopropylicus* + *Acidum lacticum*)

101 Kod EAN UCC: 5909990425402

Skład:

100 g roztworu na skórę zawiera:

- substancje czynne: propanolu 45 g, alkoholu izopropylowego 28 g, kwasu mlekowego 0,3 g;
- substancje pomocnicze:
 - alkohol mirystynowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol 85%, sodu mleczan, woda oczyszczona.

Wyłącznie do stosowania na skórę

Opis działania:

Lek działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.

Lek *sensiva* działa na drobnoustroje, takie jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym *Staphylococcus aureus*, paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis* oraz *Klebsiella pneumoniae*) i mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*). Lek *sensiva* działa grzybobójczo, m.in. na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) i dermatofity (w tym *Trichophyton mentagrophytes* oraz *Microsporum gypseum*). Lek działa wirusobójczo na wirusy, m.in. na HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy oraz wirus krowianki.

Wskazania:

Lek *sensiva* jest alkoholowym produktem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

Kiedy nie stosować leku *sensiva*

Nie stosować w przypadku uczulenia na propanol, alkohol izopropylowy, kwas mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:

3 ml leku *sensiva* należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi:

W umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml leku *sensiva* przez 90 sekund, dbając o stałe zwilżenie skóry lekiem.

Począć do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem stosowania leku *sensiva* należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek sensiva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku sensiva

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

Lek łatwopalny.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Pozwolenie nr **13044**

Termin ważności:

Numer serii:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Schülke & Mayr GmbH

Robert Koch Strasse 2

22851 Norderstedt

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

tel. 022-11-60-700, fax: 022-11-60-701

Data ostatniej aktualizacji tekstu:

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

sensiva