

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ascalcin Plus o smaku malinowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący
(*Acidum acetylsalicylicum* + *Acidum ascorbicum* + *Calcium*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saşetka zawiera:

kwias acetylosalicylowy	- 500 mg
kwias askorbowy (witamina C)	- 300 mg
wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu)	- 200 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym sodu wodorowęglan, aspartam i betakaroten (zawiera sacharozę) – szczególowe informacje w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek musujący

6 saşetek Kod EAN UCC: 5909990833351

8 saşetek Kod EAN UCC: 5902768437812

10 saşetek Kod EAN UCC: 5909990833368

14 saşetek Kod EAN UCC: 5909990833375

20 saşetek Kod EAN UCC: 5909990833382

28 saşetek Kod EAN UCC: 5909990833399

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

URGO Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142 B

02-305 Warszawa

{logo}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17517

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym.

Leczenie:

- objawów przeziębienia i grypy,
- gorączki,
- bólów mięśni i stawów,
- bólów głowy w tym migrenowych,
- bólów zębów,

- nerwobólów.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

- Dorośli: 1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową to 6 saszetek.

- Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszетка 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

- Dzieci powyżej 12 lat: 1 saszетка 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porozumienia z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Ascalcin Plus o smaku malinowym

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ascalcin Plus o smaku malinowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący
(*Acidum acetylsalicylicum* + *Acidum ascorbicum* + *Calcium*)

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

URGO Sp. z o.o.

{logo}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

Lek działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie.