

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE BLISTER (BLISTRY)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPARGIN

17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu; tabletki

Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletki zawiera 17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze w tym 53 mg sacharozy - patrz pkt. 2 ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki

25 tabletek Kod kreskowy EAN

5	9	0	9	9	9	0	2	1	2	3	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

50 tabletek Kod kreskowy EAN UCC

5	9	0	9	9	9	0	2	1	0	7	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

75 tabletek Kod kreskowy EAN UCC

5	9	0	9	9	9	0	2	1	2	3	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2107

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania do stosowania**

Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu w organizmie:

- w zaburzeniach pracy serca spowodowanych niedoborem magnezu i potasu,
- zapobiegawczo w chorobie niedokrwiennej serca i w zagrożeniu zawałem serca,
- wspomagająco u pacjentów po zawale serca (w okresie powrotu do zdrowia),
- po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które spowodowały zmniejszenie stężenia magnezu i potasu,
- po długotrwałym stosowaniu glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).

Sposób stosowania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Zwykle stosuje się doustnie od 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę, po posiłku, czyli od 2 do 6 tabletek na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ASPARGIN

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPARGIN

17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu; tabletki
(*Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas*)

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

FSP FILOFARM

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Exp:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

25 tabletek