

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPIGOLA® smak miodowo-cytrynowy bez cukru, 2 mg + 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde
Lidokainy chlorowodorek jednowodny + Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy + Amylometakrezol

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pastylka twarda zawiera jako substancje czynne: 2,0 mg lidokainy chlorowodoru jednowodnego, 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: sacharyna sodowa (E 954), izomalt (E 953), maltitol ciekły (E 965), żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110), olejek miętowy, aromat cytrynowy, aromat miodowy, kwas winowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pastylki twarde

12 pastylek	Kod: 5908229303917
16 pastylek	Kod: 5908229303924
24 pastylki	Kod: 5908229303931
36 pastylek	Kod: 5908229303948
48 pastylek	Kod: 5908229303955

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.

Nie połykać pastylek.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Bayer [logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 28497

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek Aspigola smak miodowo-cytrynowy bez cukru jest wskazany do miejscowego, krótkotrwałego, objawowego leczenia dolegliwości bólowych jamy ustnej i gardła, np. zapalenie gardła (tj. ból tylnej ściany gardła i trudności w przełykaniu), ból gardła oraz po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych, u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

W celu uzyskania informacji dotyczących dawkowania należy zapoznać się z treścią ulotki.

✓ ból gardła

✓ zapalenie gardła

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Aspigola

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
--

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPIGOLA® smak miodowo-cytrynowy bez cukru, 2 mg + 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde
Lidokainy chlorowodorek jednowodny + Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy + Amylometakrezol

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer [logo podmiotu odpowiedzialnego]

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE