

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****ASPIRIN C**

400 mg + 240 mg, tabletki musujące

*Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH****Skład:**

Jedna tabletka zawiera jako substancje czynne 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze. Zawiera sól – ostrzeżenia, patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka musująca.

10 tabletek musujących Kod: 5909990192816

20 tabletek musujących Kod: 5909990192823

40 tabletek musujących Kod: 5908229303566

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

-

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

-

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Bayer {logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1928

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

z witaminą C

Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy, tj.:

- gorączka
- ból głowy
- bóle mięśniowe

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym w grypie i przeziębieniu.

Wskazania:

Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np.: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe).

Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.

Dawkowanie:

Dorośli – jednorazowo 1–2 tabletki musujące.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza – jednorazowo 1 tabletka musująca.

Rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach. Nie zażywać na czczo.

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania w ulotce dołączonej do opakowania.

Leku Aspirin C nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Aspirin C

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.