

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPIRIN C FORTE,
800 mg + 480 mg, tabletki musujące
Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład:
Jedna tabletkę zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego (witamina C).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: wodorowęglan sodu modyfikowany: sodu wodorowęglan i sodu węglan; kwas cytrynowy; powidon; krzemionka koloidalna bezwodna. Zawiera sól – ostrzeżenia, patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletkę musującą

10 tabletek musujących	Kod: 5908229300756
20 tabletek musujących	Kod: 5908229300763

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

-

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

-

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**Podmiot odpowiedzialny:**

Bayer Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Bayer {logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 22290

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

z witaminą C

Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przeziębieniu i grypie.

Działanie:

- przeciwgorączkowe
- przeciwbólowe
- przeciwzapalne

Wskazania:

Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe).

Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.

Dawkowanie:

Dorośli: jednorazowo 1 tabletka musująca. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin. W ciągu doby nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące. Nie stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ASPIRIN C FORTE

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.