

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko zawierające butelkę oraz dozownik w formie strzykawki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 mg/5 ml, zawiesina doustna

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, między innymi glicerol i maltitol ciekły.
Nie zawiera cukru, barwników i alkoholu.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina doustna.
Specjalny dozownik.

100 ml	kod EAN	5909990080694
150 ml	kod EAN	5909990080700

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

CE 0543 - znak dotyczy wyłącznie strzykawki.
Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 14209

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Obniża gorączkę, uśmierza ból, działa przeciwzapalnie.
Od 3 miesięcy.
Smak truskawkowy.

Wiek dziecka	Dawka jednorazowa	Maksymalna dawka dobową
3-6 miesięcy (5-7,6 kg)	2,5 ml	3 razy po 2,5 ml
6-12 miesięcy (7,7-9 kg)	2,5 ml	3 do 4 razy po 2,5 ml
1-3 lata (10-16 kg)	5 ml	3 razy po 5 ml
4-6 lat (17-20 kg)	7,5 ml	3 razy po 7,5 ml
7-9 lat (21-30 kg)	10 ml	3 razy po 10 ml
10-12 lat (31-40 kg)	15 ml	3 razy po 15 ml

Nie należy stosować większej dawki niż zalecana.
Wstrząsnąć przed użyciem.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE`A

Nurofen dla dzieci o smaku truskawkowym

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko zawierające butelkę oraz łyżkę miarową

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 mg/5 ml, zawiesina doustna

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: między innymi glicerol i maltitol ciekły.
Nie zawiera cukru, barwników i alkoholu.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina doustna.

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa 2,5 ml/5 ml ułatwiająca dawkowanie.

100 ml	kod EAN	5909990080694
150 ml	kod EAN	5909990080700

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 14209

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC- Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Obniża gorączkę, uśmierza ból, działa przeciwzapalnie.
Od 3 miesięcy.
Smak truskawkowy.

Wiek dziecka	Dawka jednorazowa	Maksymalna dawka dobową
3-6 miesięcy (5-7,6 kg)	2,5 ml	3 razy po 2,5 ml
6-12 miesięcy (7,7-9 kg)	2,5 ml	3 do 4 razy po 2,5 ml
1-3 lata (10-16 kg)	5 ml	3 razy po 5 ml
4-6 lat (17-20 kg)	7,5 ml	3 razy po 7,5 ml
7-9 lat (21-30 kg)	10 ml	3 razy po 10 ml
10-12 lat (31-40 kg)	15 ml	3 razy po 15 ml

Nie należy stosować większej dawki niż zalecana.

Wstrząsnąć przed użyciem.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE`A

Nurofen dla dzieci o smaku truskawkowym