

Butelka PE z kroplomierzem PE i zakrętką PE z pierścieniem gwarancyjnym: 100 g

Spirytus salicylowy
(Spiritus salicylatus)

Roztwór na skórę, 2%
Zawartość: 100 g

Skład na 100 g:

substancja czynna: Acidum salicylicum	2,0 g
substancje pomocnicze: Ethanolum (760 g/l)	68,0 g
Aqua purificata	30,0 g

Wskazania: Produkt jest stosowany zewnętrznie jako środek o słabym działaniu odkażającym.
Przeznaczony do dezynfekcji skóry, m.in. po otarciach naskórka, w trądziku, łojotoku;

Sposób stosowania i droga podania: Lek stosuje się miejscowo. Po otarciach naskórka przecierać doraźnie skórę tamponem lub wacikiem nasączonym produktem. W trądziku, łojotoku przecierać miejsca chorobowo zmienione 1 – 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Leku nie należy stosować u osób nadwrażliwych na kwas salicylowy i jego pochodne.

Ostrzeżenia specjalne: Lek zawiera kwas salicylowy, który ma umiarkowane działanie drażniące i u osób uczulonych na salicylany może powodować wystąpienie miejscowego zapalenia kontaktowego skóry. Ze względu na zawartość alkoholu, częste stosowanie może powodować podrażnienie i wysuszenie skóry.

Ze względu na zawartość kwasu salicylowego unikać kontaktu z błonami śluzowymi. Nie stosować leku na otwarte rany i duże powierzchnie skóry ze względu na wchłanianie etanolu i możliwość wystąpienia objawów zatrucia kwasem salicylowym. Nie stosować u niemowląt.

Zachować ostrożność stosując u dzieci. Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Chronić oczy. Środek łatwopalny.

Interakcje: Brak danych

Ciąża i okres karmienia piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie: Zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Działania niepożądane: Przy właściwym stosowaniu nie są znane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Nr serii:

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Kod EAN UCC:

Informacja podana Braille'm: Spirytus salicylowy

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów
tel./fax 12 65-66-235

Butelka PE z zakrętką PE z pierścieniem gwarancyjnym: 800 g

Butelka PE z zakrętką PE z pierścieniem gwarancyjnym. Opakowanie przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym.

Spirytus salicylowy
(Spiritus salicylatus)

Roztwór na skórę, 2%
Zawartość: 800 g

Skład na 100 g:

substancja czynna: Acidum salicylicum	2,0 g
substancje pomocnicze: Ethanolum (760g/l)	68,0 g
Aqua purificata	30,0 g

Wskazania: Produkt jest stosowany zewnętrznie jako środek o słabym działaniu odkażającym. Przeznaczony do dezynfekcji skóry, m.in. po otarciach naskórka, w trądziku, łojotoku;

Sposób stosowania i droga podania: Opakowanie przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania: Leku nie należy stosować u osób nadwrażliwych na kwas salicylowy i jego pochodne.

Ostrzeżenia specjalne: Lek zawiera kwas salicylowy, który ma umiarkowane działanie drażniące i u osób uczulonych na salicylany może powodować wystąpienie miejscowego zapalenia kontaktowego skóry. Ze względu na zawartość alkoholu, częste stosowanie może powodować podrażnienie i wysuszenie skóry.

Ze względu na zawartość kwasu salicylowego unikać kontaktu z błonami śluzowymi. Nie stosować leku na otwarte rany i duże powierzchnie skóry ze względu na wchłanianie etanolu i możliwość wystąpienia objawów zatrucia kwasem salicylowym. Nie stosować u niemowląt.

Zachować ostrożność stosując u dzieci. Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Chronić oczy. Środek łatwopalny.

Interakcje: Brak danych

Ciąża i okres karmienia piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie: Zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Działania niepożądane: Przy właściwym stosowaniu nie są znane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Nr serii:

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Kod EAN UCC:

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów
tel./fax 12 65-66-235