

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils Junior
1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład:

Jedna pastylka twarda zawiera substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: esencję truskawkową, antocyjaninę (E 163), sacharynę sodową (E 954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

12 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990781478
16 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990778522
24 pastylki twarde	Kod EAN: 5909990778539
36 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990646500

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 801 88 88 07

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 7785

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Każda pastylka Strepsils Junior zawiera dwie substancje czynne o działaniu:

- przeciwwirusowym
- przeciwbakteryjnym

Lek Strepsils Junior jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Pastylki o smaku truskawkowym bez cukru

Jak stosować lek Strepsils Junior:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Strepsils Junior