



## 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny  
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  
ul. Okunin 1  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 25715

## 13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Upłynnina wydzielinę śluzową i ułatwia odkrztuszenie

Strepsils na kaszel jest wskazany w leczeniu chorób dróg oddechowych przebiegających z nadmierną produkcją wydzieliny śluzowej lub wytwarzaniem zbyt lepkiego śluzu.

**Dorośli i osoby w podeszłym wieku:** Należy przyjmować dwie kapsułki 3 razy na dobę. Jeśli nasilenie objawów zmniejszy się, dawkę należy zmniejszyć do jednej kapsułki przyjmowanej cztery razy na dobę. Nie podawać dzieciom i młodzieży. Jeśli po upływie 5 dni objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Strepsils na kaszel, jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub jelit.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Strepsils na kaszel 375 mg kapsułki, twarde

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**Blister**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Strepsils na kaszel, 375 mg, kapsułki, twarde

*Carbocisteinum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. INNE**