

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils truskawkowy bez cukru  
1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde  
*Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNYCH

**Skład:**

Jedna pastylka twarda zawiera substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: esencję truskawkową, antocyjaninę (E 163), sacharynę sodową (E 954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

12 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990192236
16 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990905430
24 pastylki twarde	Kod EAN: 5909990192229

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

**Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.**

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):  
**Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.**

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:** Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 801 88 88 07

**12. NUMER(POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: R/1922

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**OTC - lek wydawany bez recepty.**

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Każda pastylka Strepsils truskawkowy bez cukru zawiera dwie substancje czynne o działaniu:

- przeciwwirusowym
- przeciwbakteryjnym

Lek Strepsils truskawkowy bez cukru jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

**Jak stosować lek Strepsils truskawkowy bez cukru:**

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssąć powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Strepsils truskawkowy bez cukru