

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Bovaclox DC, (250 mg + 500 mg)/4,5 g, zawiesina dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tubostrzykawka (4,5 g) zawiera:

Ampicylina (w postaci ampicyliny trójwodnej) 250 mg

Kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej) 500 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

24 tubostrzykawki po 4,5 g

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne - 28 dni.

Mleko - 96 godzin od wycielenia, lecz jeśli poród nastąpił przed upływem 45 dni od podania produktu okres karencji wynosi 45 dni + 96 godzin od podania produktu.

Nie stosować u krów, u których występuje bardzo krótki okres zasuszania.

Nie stosować później niż na 45 dni przed przewidywanym terminem porodu.

Nie stosować u krów mlecznych w okresie laktacji.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.
{logo Scanvet Poland}

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

381/97

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Tubostrzykawka****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Bovaclox DC

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tubostrzykawka (4,5 g) zawiera:

| | |
|--|--------|
| Ampicylina (w postaci ampicyliny trójwodnej) | 250 mg |
| Kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej) | 500 mg |

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

4. DROGI PODANIA

Dowymieniowo

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne - 28 dni.

Mleko - 96 godzin od wycielenia, lecz jeśli poród nastąpił przed upływem 45 dni od podania produktu okres karencji wynosi 45 dni + 96 godzin od podania produktu.

Nie stosować u krów, u których występuje bardzo krótki okres zasuszania.

Nie stosować później niż na 45 dni przed przewidywanym terminem porodu.

Nie stosować u krów mlecznych w okresie laktacji.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

logo Scanvet Poland

9. NUMER SERII

Lot {numer}

Dodatkowe informacje

4,5 g