

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko 50 g lub 100 g

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Pojemnik 200 g lub 500 g lub 1000 g

Pojemnik 1550 g lub 3000 g

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Suramox 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy gram zawiera:

Substancja czynna:

Amoksycylina

500 mg

(w postaci amoksyliny trójwodnej)

565 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 g

100 g

200 g

500 g

1000 g

1550 g

3000 g

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia, kura (brojler), indyk

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie w wodzie do picia.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Świnie:

Tkanki jadalne: 14 dni

Kury (brojlery):

Tkanki jadalne: 1 dzień

Indyki:

Tkanki jadalne: 3 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 dni.

Produkt rozpuszczony należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Pojemnik 200 g, 500 g, 1 kg, 1,55 kg, 3 kg: Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 1577/04

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Pojemnik 100 g

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Suramox 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy gram zawiera:

Substancja czynna:

Amoksycylina	500 mg
(w postaci amoksycyliny trójwodnej)	565 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia, kura (brojler), indyk

4. DROGI PODANIA

Podanie w wodzie do picia.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Świnie:

Tkanki jadalne: 14 dni

Kury (brojlery):

Tkanki jadalne: 1 dzień

Indyki:

Tkanki jadalne: 3 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 dni.

Produkt rozpuszczony należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

9. NUMER SERII


Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Pojemnik 50 g

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Suramox



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

500 mg/g

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}