

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Theraflu Total Grip, 500 mg + 6,1 mg + 100 mg, kapsułki twarde

Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Guaifenesinum

Dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda kapsułka zawiera: 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny, 100 mg gwajafenezyny

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułki twarde

8 kapsułek

Kod EAN 5909991304485

16 kapsułek

Kod EAN 5909991304492

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Nie rozgryzać

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 23577

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

KIEDY STOSOWAĆ LEK THERAFLU TOTAL GRIP

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, gorączkę, zablokowany nos i produktywny kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny. Lek wykazuje również działanie wykrztuśne w przypadku mokrego kaszlu (rozzredza wydzielinę).

JAK PRZYJMOWAĆ THERAFLU TOTAL GRIP

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku 16 lat i starsza o masie ciała 50 kg i większej.

Dwie kapsułki, co 4 do 6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 6 kapsułek na dobę. Nie stosować leku dłużej niż 3 dni.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie rozgryzać.

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 16 lat i młodzieży w wieku 16 – 18 lat ważących mniej niż 50 kg.

NIE PRZYJMOWAĆ DAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub jeżeli się nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek zawiera paracetamol

Nie należy stosować leku równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W razie przedawkowania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Nie należy stosować równocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu kaszlu, przeziębienia lub kataru, a także z alkoholem.

Nie należy stosować leku podczas ciąży lub karmienia piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- stosowania innych leków,
- gdy pacjent znajduje się pod opieką medyczną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

theraflu total grip kapsułki

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
--

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Theraflu Total Grip, 500 mg + 6,1 mg + 100 mg, kapsułki twarde

Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Guaifenesinum

2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE
