

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 tabletka zawiera substancję czynną ibuprofen 200 mg.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również sacharozę.

Wykaz substancji pomocniczych – patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane.

6 tabletek powlekanych kod EAN 5909990706839

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny.

Od 6. lat. Nie stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/7068

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania:

Bóle różnego pochodzenia (ból głowy, ból zębów np. po ekstrakcji, nerwoból, ból mięśniowy, stawowy i kostny, ból towarzyszący grypie i przeziębieniu). Gorączka. Bolesne miesiączkowanie.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg): w razie potrzeby, 1 tabletka 200 mg co 6 godzin.

Nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę (600 mg).

Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg): w razie potrzeby, 1 tabletka 200 mg co 4 do 6 godzin.

Nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę (800 mg).

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): Dawka początkowa – dwie tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie

stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować czterogodzinną przerwę między dawkami.

U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. Jeśli mimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe, dodatkowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nurofen tabletki powlekane

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 tabletka zawiera substancję czynną ibuprofen 200 mg.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również sacharozę.

Wykaz substancji pomocniczych – patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane.

2 tabletki powlekane	kod EAN	5909990668731
4 tabletki powlekane	kod EAN	5909990706815
8 tabletek powlekanych	kod EAN	5909990706853
10 tabletek powlekanych	kod EAN	5909990973248
12 tabletek powlekanych	kod EAN	5909990706822
12 tabletek powlekanych		
w opakowaniu plastikowym	kod EAN	5909990706846
24 tabletki powlekane	kod EAN	5909990214976
36 tabletek powlekanych	kod EAN	5909990214983
48 tabletek powlekanych	kod EAN	5909990706860

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Nie stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/7068

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania:

Bóle różnego pochodzenia (ból głowy, ból zębów np. po ekstrakcji, nerwoból, ból mięśniowy, stawowy i kostny, ból towarzyszący grypie i przeziębieniu). Gorączka. Bolesne miesiączkowanie.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg):

w razie potrzeby, 1 tabletka 200 mg co 6 godzin.

Nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę (600 mg).

Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg):

w razie potrzeby, 1 tabletka 200 mg co 4 do 6 godzin.

Nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę (800 mg).

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): Dawka początkowa – dwie tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować czterogodzinną przerwę między dawkami.

U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. Jeśli mimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe, dodatkowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen tabletki powlekane