

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ULTRAPIRYNA, 325 mg, tabletki dojelitowe
Acidum acetylsalicylicum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

US Pharmacia Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ULTRAPIRYNA, 325 mg, tabletki dojelitowe
Acidum acetylsalicylicum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 tabletkę zawiera 325 mg kwasu acetylosalicylowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 tabletki dojelitowe	Kod EAN: 5907377139492
6 tabletek dojelitowych	Kod EAN: 5902768919097
12 tabletek dojelitowych	Kod EAN: 5902768919103
18 tabletek dojelitowych	Kod EAN: 5907377139508
30 tabletek dojelitowych	Kod EAN: 5909990699810
100 tabletek dojelitowych	Kod EAN: 5909990699827

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Dawkowanie i droga podania: Podanie doustne. Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo – 1 tabletkę co 4 godziny lub 1 do 2 tabletek co 6 godzin. Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłkach popijając dużą ilością płynu.

U młodzieży w wieku powyżej 16 lat nie należy stosować więcej niż 1500 mg kwasu acetylosalicylowego na dobę.

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat (patrz punkt 2 ulotki).

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia: Nie stosować w czynnej chorobie wrzodowej żołądka lub/i dwunastnicy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

22 543 60 00

[logotyp podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6998

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działa:

- PRZECIWBÓLOWO
- PRZECIWGORĄCZKOWO
- PRZECIWZAPALNIE

Lek stosowany w leczeniu przeziębienia i grypy

Wskazania: Lek działa **przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo**. Specjalna otoczka powoduje, że tabletkę nie rozpada się w kwaśnym soku żołądkowym, lecz dopiero w jelicie cienkim, co pozwala wyeliminować drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Wskazaniem do stosowania leku są: przeziębienie, grypa, stany gorączkowe; leczenie przewlekłe bólu i stanów zapalnych, na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów, młodzieńczym zapaleniu stawów, toczeniu rumieniowatym układowym, chorobie zwyrodnieniowej stawów, zespole Reitera (zapalenie spojówek, zmiany śluzówkowo-skinne, zapalenie stawów) i w zmianach okołostawowych; łagodne i słabo nasilone bóle zębów, głowy, bóle menstruacyjne.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ultrapiryna