

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

BUTELKI 100, 500 ML, KANISTER 5 L

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Skinman soft
(Alcohol isopropylicus + Benzalkonii chloridum + Acidum undecylenicum)
(60 g + 0,3 g + 0,1 g)/100g roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ (SUBSTANCJI CZYNNYCH)

alkohol izopropylowy – 60,0 g, chlorek benzalkoniowy, roztwór 50% – 0,3 g, kwas undecylowy – 0,1 g;

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

glicerol 85 %, alkohol mirystynowy, środek zapachowy (Martine PH 799864),
błękit patentowy (E 131), woda oczyszczona

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór na skórę

Butelka 100 ml EAN KOD 5909990021451

Butelka 500 ml EAN KOD 5909990021468

Kanister 5 l EAN KOD 5909990021475

5. SPOSÓB I DROGA DROGI PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek do użytku zewnętrznego.

Do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

Lek działa na bakterie, w tym prątki gruźlicy, oraz grzyby i wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV), wirusy opryszczki oraz rotawirusy.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Lek jest łatwopalny. Nie rozpylać w pobliżu płomienia; punkt zapłonu (zgodnie z normą DIN 51755) 22 °C. Przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia leku; stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu.

Należy przestrzegać zasad stosowania leku oraz zasad bezpieczeństwa.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i płomieniem - lek łatwopalny.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

12. NUMER POZWOLENIA NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Numer pozwolenia: 13047

13. NUMER SERII, KODY DONACJI I PRODUKTU

Numer serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Roztwór gotowy do stosowania. Lek należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

Higieniczne odkażanie rąk:

3 ml leku wcierać w dłonie przez 30 sekund.

Chirurgiczne odkażanie rąk:

5 ml leku wcierać w dłonie przez 1 ½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. Dłonie podczas dezynfekowania muszą być ciągle wilgotne.

Działanie prątkobójcze:

3 ml leku wcierać w dłonie przez ½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

Przy skażeniu wirusem opryszczki:

Lek wcierać w ręce przez 30 sekund, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Przy skażeniu rotawirusami:

Lek wcierać w ręce przez 1 minutę, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Inaktywacja wirusów osłonkowych (w tym HBV, HCV, HIV):

Lek wcierać w ręce przez 30 sekund, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować:

- do odkażania błon śluzowych,
- w okolicy oczu,
- w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- doustnie,
- na zranioną lub wysuszoną skórę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Skinman soft

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

100ml	3005290
500ml	3005300
5l	3005310

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA