

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CORSODYL, 0,2% w/v, płyn do stosowania w jamie ustnej,
(Chlorhexidinum gluconatum)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
--

Skład: 0,2 % w/v roztwór chlorheksydyny glukonianu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym glicerol i sorbitol- patrz p. 2 ulotki

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
--

płyn do stosowania w jamie ustnej

300 ml – 1 butelka kod EAN 5909990646821

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
--

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Unikać poalkoholizacji.

Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Niektóre składniki past do zębów osłabiają działanie substancji czynnej- chlorheksydyny. Dlatego nie należy stosować płynu Corsodyl bezpośrednio po umyciu zębów.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo}

Podmiot odpowiedzialny:

Haleon Poland Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia 13030

13. NUMER SERII

Nr serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie przeciwbakteryjne.

Smak miętowy.

DZIAŁANIE

Hamowanie tworzenia się płytki nazębnej.

Pomocniczo:

- w leczeniu i zapobieganiu zapaleniu dziąseł,
- w celu utrzymania higieny jamy ustnej zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można stosować właściwego szczotkowania zębów (np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej oraz u pacjentów upośledzonych fizycznie lub umysłowo).

Do stosowania po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu w celu przyspieszenia gojenia się dziąseł.

Leczenie aft oraz zakażeń jamy ustnej drożdżakami:

- np. odprotezowe zapalenie jamy ustnej oraz pleśniawki.

DAWKOWANIE

Dwa razy na dobę, przez około jedną minutę dokładnie płukać usta 10 ml płynu.

Przed zabiegiem stomatologicznym należy płukać usta 10 ml leku przez jedną minutę.

W leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanym przez protezy zębowe należy po umyciu protez dwa razy dziennie moczyć je w płynie Corsodyl przez piętnaście minut.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
--

Nie dotyczy.