

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SORA FORTE  
10 mg/ml, szampon leczniczy  
*Permethrinum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:** 1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: sodu siarczan laurylowy oksyetylenowany, betainę kokamidopropylową, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, diazolidynomocznik, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glikolu etylenowego distearynian, monoetanoamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol laurylowy oksyetylenowany 10, olej rycynowy uwodorniony, alkohol laurylowy oksyetylenowany 2, kompozycję zapachową, wodę oczyszczoną.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Szampon leczniczy

50 ml

KOD EAN UCC: 5909990964635

Do opakowania dołączony jest grzebień higieniczny, ułatwiający wyczesywanie martwych wszy i jaj (gnid).

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

PODANIE NA SKÓRĘ

**Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.**

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Stosować wyłącznie na włosy głowy.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

#### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  
Przechowywać w oryginalnej, szczelnie zamkniętej tubie.

#### 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

#### 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

**Podmiot odpowiedzialny:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice

#### 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19949

#### 13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

#### 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek dostępny bez recepty.

#### 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

do zwalczania wszawicy głowowej  
wiek: powyżej 3 lat

**Wskazania do stosowania:**

Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat.

**Sposób użycia:**

***Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat.***

Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć tubą. Na zwilżone włosy głowy należy nałożyć odpowiednią ilość szamponu w stosunku do długości i gęstości włosów, tak aby dokładnie nasycić włosy i skórę głowy. Następnie równomiernie rozprowadzić szampon, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Przyjmuje się że objętość 50 ml jest wystarczająca do umycia włosów średniej długości (włosy do ramion). Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepek na włosy pokryte szamponem. Uzyskaną pianę należy **pozostawić na włosach przez 10 minut**, a następnie spłukać włosy wodą i starannie wyczesać grzebieniem dołączonym do opakowania, w celu usunięcia martwych wszy i jaj (gnid).

Jeżeli po 7-10 dniach leczenia permetryną zostaną znalezione żywe wszy, leczenie to należy powtórzyć.

Jeżeli po 14-20 dniach nadal będzie się znajdować żywe wszy, należy się skonsultować z lekarzem, aby rozważyć odpowiednie alternatywne możliwości leczenia.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

<b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A</b>
---

sora forte

<b>17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D</b>
--

Nie dotyczy.

<b>18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA</b>
---

Nie dotyczy.