

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

VIAGRA CONNECT MAX, 50 mg, tabletki powlekane

syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka: 50 mg syldenafilu.

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

2 tabletki powlekane kod: 1210001168527

4 tabletki powlekane kod: 1210001168510

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Opakowanie zabezpieczone

Nie stosować, jeśli pudełko było otwierane.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Upjohn EESV
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel
Holandia

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 24401

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy wypełnić listę kontrolną znajdującą się w opakowaniu!

Lek VIAGRA CONNECT MAX przeznaczony jest dla mężczyzn w wieku powyżej 18 lat, którzy mają trudności z osiągnięciem i (lub) utrzymaniem erekcji wystarczającej dla podejmowania aktywności seksualnej.

Dla mężczyzn powyżej 18 roku życia. Do leczenia zaburzeń erekcji.

Na erekcję

Kiedy **NIE przyjmować** leku:

- jeśli pacjent **nie ma** problemów z erekcją,
- jeśli pacjent **przyjmuje leki z grupy azotanów** z powodu bólu w klatce piersiowej lub niewydolności serca,
- jeśli pacjent przyjmuje riociguat (lub inne leki pobudzające cyklazę guanylanową) z powodu podwyższonego ciśnienia krwi w płucach,

- jeśli pacjent przyjmuje rytonawir w leczeniu zakażenia HIV,
- jeśli lekarz polecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej z powodu problemów z sercem lub naczyniami krwionośnymi,
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca, odczuwa ból lub dyskomfort w klatce piersiowej / dławica piersiowa,
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby,
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze,
- jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka utrata wzroku lub jeśli stwierdzono u pacjenta pewną wrodzoną chorobę oczu,
- jeśli penis pacjenta jest zniekształcony,
- jeśli pacjent jest uczulony na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku pacjent powinien to omówić z farmaceutą lub lekarzem, jeśli:

- **aktywność fizyczna o małej lub umiarkowanej intensywności wywołuje u pacjenta silną duszność lub ból w klatce piersiowej,**
- pacjent ma problemy z sercem,
- pacjent ma nieregularne bicie serca / kołatanie serca,
- pacjent ma nieleczone lub nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze,
- pacjent przyjmuje którykolwiek z innych leków wymienionych w ulotce,
- pacjent stosuje jakikolwiek inny lek na zaburzenia erekcji,
- u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła erekcja trwająca dłużej niż 4 godziny,
- pacjent cierpi na wrzody żołądka lub skazę krwotoczną,
- u pacjenta stwierdzono łagodne lub umiarkowane problemy z wątrobą,
- u pacjenta rozpoznano ciężkie problemy z nerkami.

Jak przyjmować:

- należy przyjmować 1 tabletkę około godziny przed planowaną aktywnością seksualną,
- tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą,
- **nie przyjmować w ciągu doby więcej niż 1 tabletkę.**

Lek VIAGRA CONNECT MAX zaczyna działać w ciągu 30-60 minut. Lek można przyjmować do 4 godzin przed planowaną aktywnością seksualną.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

VIAGRA CONNECT MAX 50 mg tabletki powlekane

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTRY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VIAGRA CONNECT MAX 50 mg, tabletki powlekane

syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Logo podmiotu odpowiedzialnego

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE