

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vicks AntiGrip Max
(1000 mg + 16 mg + 4 mg)/saszetkę, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum + Phenylephrini hydrogentartras + Chlorphenamini maleas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda saszetka zawiera:
Paracetamol – 1000 mg
Fenylefryny wodorowinian – 16 mg
Chlorfenaminy maleinian – 4 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Ponadto zawiera mannitol.
Dalsze informacje, patrz załączona ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego.

10 saszetek	kod EAN 5909991139544
14 saszetek	kod EAN 5907589874723

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci ze względu na dużą dawkę paracetamolu.

UWAGA! Lek zawiera paracetamol. Nie przyjmować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol, sympatykomimetyków i (lub) leków przeciwuczuleniowych - patrz ulotka.

Lek może powodować senność - patrz ulotka.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Wick - Pharma - Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40
65824 Schwalbach am Taunus
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 21871

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Vicks AntiGrip Max jest przeznaczony do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy takich, jak:

- ból głowy
- ból mięśni
- ból gardła
- ból zatok przynosowych
- gorączka
- obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
- katar

Vicks AntiGrip Max, jest przeznaczony do leczenia objawów przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z tworzeniem wydzieliny.

Dawkowanie: Dorośli: jedna saszetka co 6-8 godzin (trzy lub cztery razy na dobę). Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu 24 godzin. U niektórych pacjentów konieczne jest zmniejszenie dawki. Szczegółowe informacje: patrz ulotka.

Sposób podawania: Zawartość jednej saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej, lecz nie wrzącej wody (najlepiej w połowie szklanki wody). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia.

Aromat pomarańczowy

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vicks AntiGrip Max

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.