

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Virumed Junior, 312,5 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Inosinum pranobexum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:**

Każdy ml zawiesiny zawiera **312,5 mg** inozyiny pranobeksu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**SUBSTANCJE POMOCNICZE:**

Zawiera również metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan oraz sorbitol (E420). Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

60 ml

Kod:	5	9	0	0	4	1	1	0	1	1	2	8	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**SPOSÓB I DROGA PODANIA:**

Podanie doustne. Zawiesinę należy popić odpowiednią ilością wody.

Jak przygotować zawiesinę i inne szczegółowe informacje: patrz ulotka dla pacjenta.

Przed każdym użyciem należy wstrząsać butelką przez co najmniej 1 minutę, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Okres ważności przygotowanej zawiesiny: 15 dni.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania sporządzonej zawiesiny, patrz ulotka. Przygotowaną zawiesinę doustną przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 15°C do 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:**

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów

(Logo Adamed)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POZWOLENIE NR: 28059

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

**LEK PRZECIWWIRUSOWY
ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU**

aromat bananowy

WSKAZANIA:

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*).

DAWKOWANIE:

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg na kg masy ciała na dobę (0,16 ml na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 9,6 ml zawiesiny) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 12,8 ml zawiesiny).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku

Zalecana dawka wynosi 50 mg na kg masy ciała na dobę, zwykle 0,16 ml na 1 kg masy ciała na dobę, w 3 lub 4 podzielonych dawkach.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

virumed junior

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
ETYKIETA NA BUTELKĘ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Virumed Junior, 312,5 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Inosinum pranobexum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każdy ml zawiesiny zawiera **312,5 mg** inozyny pranobeksu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan oraz sorbitol (E420). Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

60 ml

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM I DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przygotowaną zawiesinę przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 15°C do 25°C nie dłużej niż 15 dni.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Adamed Pharma S.A.

(logo Adamed)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
