

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xylorin Protect
0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Oxymetazolini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
--

Skład:
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodoru

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Deksopantenol, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
--

aerozol do nosa, roztwór
7,5 ml Kod: 5907734713952

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie donosowe.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
--

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
--

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:
Perrigo Poland Sp. z o.o. {logo podmiotu odpowiedzialnego}
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 27386

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Dla dorosłych i dzieci w wieku od 10 lat.

- Krótkotrwałe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa przy przeziębieniu i w zapaleniu zatok
- Zmniejsza ilość wydzieliny
- Udrożnia nos
- Działa do 12h
- Dekspantenol zawarty w leku nawilża suchą błonę śluzową nosa

Dawkowanie:

- 2 rozpylenia do każdego nozdrza 2 do 3 razy na dobę.
- Stosować maksymalnie przez 10 kolejnych dni.

Lek nie zawiera środków konserwujących, więc ze względów technicznych butelka jest do połowy pełna. Butelkę należy przechowywać z założoną nasadką ochronną.

Przed pierwszym użyciem aerozolu - trzymając butelkę pionowo rozpylić lek 5 razy w powietrze do uzyskania równomiernego aerozolu. Jeśli pompka nie była używana przez dłuższy czas, należy ją wypełnić trzema rozpyleniami w powietrze.

Następnie dawkować zgodnie z instrukcją podaną w ulotce dla pacjenta.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Xylorin Protect 0,5 mg/ml, aerozol do nosa

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

BUTELKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Xylorin Protect
0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Oxymetazolini hydrochloridum

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

7,5 ml

6. INNE

Dla dorosłych i dzieci w wieku od 10 lat

2 rozpylenia do każdego nozdrza 2 do 3 razy na dobę.
Krótkotrwałe leczenie niedrożności nosa i w zapaleniu zatok.
Bez środków konserwujących.

{logo Perrigo}