

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zioła metaboliczne (ziola przeciwtrądzikowe)
Species metabolicae

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład saszetki:

Kłącze perzu (*Graminis rhizoma*) – 0,60 g
Ziele fiołka trójbarwnego (*Violae tricoloris herba*) – 0,40 g
Korzeń cykorii (*Cichorii radix*) – 0,40 g
Liść pokrzywy (*Urticae folium*) – 0,34 g
Owocnia fasoli (*Phaseoli pericarpium*) – 0,20 g
Korzeń rzewienia (*Rhei radix*) – 0,06 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zioła do zaparzania w saszetkach, 2 g/saszetkę

30 saszetek po 2,0 g

Kod: 5909990728749

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Jedną saszetkę zalać szklanką wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie pozostawić na 10-15 minut pod przykryciem. Pić 2 razy dziennie po szklance świeżo przygotowanego odwaru.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, stany zapalny jelita grubego, nerek, zapalenie wyrostka robaczkowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ze względu na zawartość korzenia rzewienia nie zaleca się przekraczania dziennej dawki preparatu, stosowania dłużej niż 7-10 dni oraz podawania dzieciom poniżej 12 lat. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na zawartość korzenia rzewienia nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309. Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Przy zastosowaniu zbyt wysokiej dawki może wystąpić działanie przeczyszczające.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Labofarm sp. z o.o.
ul. Lubichowska 176B

83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15963

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania:

Środek moczopędny stosowany pomocniczo w trądziku młodzieńczym.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Zioła metaboliczne

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

19. INNE

Data zatwierdzenia informacji: