

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Opakowanie tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Duphagol, proszek do sporządzania roztworu doustnego
Makrogol 3350 + sodu chlorek + potasu chlorek + sodu wodorowęglan

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 saszetka zawiera:

Makrogol 3350	13,125 g
Sodu chlorek	350,7 mg
Potasu chlorek	46,6 mg
Sodu wodorowęglan	178,5 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

smak cytrynowy

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Saszetki 13,8 g: 10 saszetek.	kod EAN: 5909990764457
Saszetki 13,8 g: 20 saszetek.	kod EAN: 5909990764464
Saszetki 13,8 g: 30 saszetek.	kod EAN: 5909990764471
Saszetki 13,8 g: 40 saszetek.	kod EAN: 5909990778553
Saszetki 13,8 g: 50 saszetek.	kod EAN: 5909990764488
Saszetki 13,8 g: 60 saszetek.	kod EAN: 5909990778560
Saszetki 13,8 g: 100 saszetek.	kod EAN: 5909990764495
Saszetki 13,8 g: 2 x 50 saszetek.	kod EAN:

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Po rozpuszczeniu zawartości saszetki roztwór przechowywać w lodówce.
Po upływie 6 godzin nieużyty roztwór należy wyrzucić.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Viatrix Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irlandia

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16432

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

W leczeniu zaparcia.

W przypadku zaparcia: 1 saszetka 1 do 3 razy na dobę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Zawartość saszetki należy rozpuścić w pół szklanki wody i wypić.

W przypadku zaklinowanego stolca: 8 saszetek na dobę. Zawartość tych saszetek należy spożyć w ciągu 6 godzin. Przygotowany roztwór jest zdalny do spożycia przez 6 godzin, pod warunkiem, że jest przechowywany w lodówce.

Lek Duphagol nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Nie należy stosować leku w przypadku niedrożności, perforacji lub ciężkich zapalnych chorób jelita.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

duphagol

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Saszетка

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Duphagol, proszek do sporządzania roztworu doustnego
Makrogol 3350 + sodu chlorek + potasu chlorek + sodu wodorowęglan

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 saszетка zawiera:

Makrogol 3350	13,125 g
Sodu chlorek	350,7 mg
Potasu chlorek	46,6 mg
Sodu wodorowęglan	178,5 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego
Saszетка 13,8 g

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Po rozpuszczeniu zawartości saszетки roztwór przechowywać w lodówce.
Po upływie 6 godzin niez użyty roztwór należy wyrzucić.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Viatrix Healthcare Limited

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Pozwolenie nr: 16432

13. NUMER SERII

Lot:

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC- Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

W leczeniu zaparcia.

W przypadku zaparcia: 1 saszetka 1 do 3 razy na dobę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Zawartość saszetki należy rozpuścić w pół szklanki wody i wypić.

W przypadku zaklinowanego stolca: 8 saszetek na dobę. Zawartość tych saszetek należy spożyć w ciągu 6 godzin. Przygotowany roztwór jest zdatny do spożycia przez 6 godzin, pod warunkiem, że jest przechowywany w lodówce.

Duphagol nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Nie należy stosować leku w przypadku niedrożności, perforacji lub ciężkich zapalnych chorób jelita.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM
