



**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH  
Sulzbacher Str. 40-50,  
D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 17297

**13. NUMER SERII**

Nr serii (LOT):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Vicks AntiGrip Complex jest przeznaczony do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy takich, jak ból głowy, ból ciała, ból gardła, gorączka, przekrwienie nosa i kaszel z odkrztuszaniem.

Wskazówki:

Rozpuścić zawartość jednej saszetki w standardowym kubku z gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia.

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby. Nie więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

**NIE NALEŻY STOSOWAĆ DAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA**

**ZAWIERA PARACETAMOL.** Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W przypadku przedawkowania, mimo dobrego samopoczucia pacjenta, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie stosować z innymi lekami przeciwgrypowymi, przeciwprzeziębieniowymi lub przeciwobrzędkowymi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przyjmuje inne leki lub jest pod opieką medyczną, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, skonsultować się z lekarzem.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

Vicks AntiGrip Complex

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

## **INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

### **SASZETKA**

#### **1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Vicks AntiGrip Complex, 500 mg + 200 mg +10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego  
*Paracetamolum + Guaiifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum*

#### **2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Jedna saszetka zawiera:  
500 mg paracetamolu  
200 mg gwajafenezyny  
10 mg fenylefryny chlorowodorku

#### **3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Ponadto zawiera:  
Sacharozę  
Sód  
Aspartam (E951)

Dalsze informacje – patrz ulotka.

#### **4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Proszek do sporządzania roztworu doustnego  
4,36 g

#### **5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie doustne.

#### **6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

#### **8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

#### **9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

#### **10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU****13. NUMER SERII**

LOT:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Vicks AntiGrip Complex jest przeznaczony do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy takich, jak ból głowy, ból ciała, ból gardła, gorączka, przekrwienie nosa i kaszel z odkrztuszaniem.

Wskazówki:

Rozpuścić zawartość jednej saszetki w standardowym kubku z gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia.

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby. Nie przekraczać 4 saszetek w ciągu doby.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

**NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANEJ DAWKI**

ZAWIERA PARACETAMOL. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W przypadku przedawkowania, mimo dobrego samopoczucia pacjenta, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie stosować z innymi lekami przeciwgrypowymi, przeciwprzeziębieniowymi lub przeciwobrzędkowymi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przyjmuje inne leki lub jest pod opieką medyczną, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 3 dniach, skonsultować się z lekarzem.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**