

Opakowanie zewnętrzne (pudełko tekturowe)

Plaster na odciski

Acidum Salicylicum

400 mg/g (400mg/plaster) plaster leczniczy

Skład:

1 g plastra leczniczego zawiera kwas salicylowy 400 mg. Inne składniki leku to: lanolina, воск pszczeli biały, żywica Staybelite Ester 10, warstwa nośna: folia PE 1000x0,120 mm, kółko z pianki PE.

Sposób użycia:

Przed użyciem plastra leczniczego należy namoczyć lub zwilżyć zrogowaciałą skórę, a następnie ją osuszyć. Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster leczniczy w ten sposób, aby „kółko” przypadało dokładnie na odcisk. Następnie owinąć oba końce plastra dookoła palca. Po 2 dniach należy zmienić plaster leczniczy, a po 4 dniach usunąć zmiękczone, zrogowaciały naskórek w ciepłej kąpieli solankowej lub mydlanej. Nie stosować w stanach zapalnych skóry i skaleczeniach. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6 plastrów leczniczych. Stosować tylko na odciski lub modzel

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki

OTC - Lek dostępny bez recepty.

Pozwolenie nr: 17129

Podmiot odpowiedzialny:

„Tolep” Sp. z o.o.

Baranowo, ul. Szamotulska 17 D

62-081 Przeźmierowo



Nr serii:

Termin ważności:

Kod EAN: 5907732318005

Informacja podana brajlem:

Plaster na odciski

Opakowanie zewnętrzne (kartonik tekturowy)

Plaster na odciski

(Acidum salicylicum)

400 mg/g plaster leczniczy

Skład:

1 g plastra leczniczego zawiera kwas salicylowy 400 mg. Inne składniki leku to: lanolina, воск pszczeli biały, żywica Staybelite Ester 10, warstwa nośna: folia PE 1000x0,120 mm, kółko z pianki PE.

Sposób użycia:

Przed użyciem plastra leczniczego należy namoczyć lub zwilżyć zrogowaciałą skórę, a następnie ją osuszyć. Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster leczniczy w ten sposób, aby „kółko” przypadało dokładnie na odcisk. Następnie owinąć oba końce plastra dookoła palca. Po 2 dniach należy zmienić plaster leczniczy, a po 4 dniach usunąć zmiękczone, zrogowaciały naskórek w ciepłej kąpieli solankowej lub mydlanej. Nie stosować w stanach zapalnych skóry i skaleczeniach. W przypadku cukrzycy lub zaburzeń ukrwienia stosować tylko za zgodą lekarza. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 plastrów leczniczych. Stosować tylko na odciski i stwardnienia naskórka

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki

OTC - Lek dostępny bez recepty.

Pozwolenie: 17129

Podmiot odpowiedzialny:

„Tolep” Sp. z o.o.

Baranowo, ul. Szamotulska 17 D

62-081 Przeźmierowo

Nr serii:

Termin ważności:

Kod EAN:

Informacja podana brajlem:

Plaster na odciski